

## ALLEGATO I – MISURE DI RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19

### MISURE DI RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE DI COVID-19



È FATTO DIVIETO DI ACCESSO ALL'AGENZIA DA PARTE DI COLORO CHE NON SONO STATI PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI.

È FATTO DIVIETO DI ACCESSO A PERSONE CON SINTOMI QUALI FEBBRE (MAGGIORE DI 37,5 °C), TOSSE, RAFFREDDORE, RISULTATI POSITIVI AL VIRUS O SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI QUARANTENA.

È FATTO DIVIETO DI ACCESSO A PERSONE CHE SONO STATE A CONTATTO DIRETTO CON PERSONE DICHIARATE CERTAMENTE POSITIVE.

#### Qualora una persona dovesse rientrare in uno di questi casi:



SINTOMI QUALI:  
FEBBRE (37,5 °C)  
TOSSE  
DIFFICOLTÀ  
RESPIRATORIE



AVER AVUTO CONTATTI DIRETTI  
CON PERSONE RISULTATE INFETTE  
O ESSERE SOGGETTO A  
PROVVEDIMENTI DI QUARANTENA

È VIETATO L'ACCESSO IN AGENZIA MA È NECESSARIO RIMANERE ALL'INTERNO DEL PROPRIO DOMICILIO,  
CONTATTANDO IL PROPRIO MEDICO OPPURE:

**Numero di pubblica utilità 1500**

FORNENDO TUTTE LE INDICAZIONI RICHIESTE E  
SEGUENDO ALLA LETTERA LE INDICAZIONI CHE RICEVERÀ

#### Al fine di ridurre la diffusione, Vi invitiamo, comunque a:



LAVARE LE MANI CON  
ACQUA E SAPONE PER  
ALMENO 60 SECONDI  
O DISINFETTARLE CON  
APPOSITO GEL  
DISINFETTANTE



INDOSSARE, PRIMA DELL'INGRESSO:  
**MASCHERINA**  
**GUANTI MONOUSO (PER RECEPTION/  
POSTAZIONI ESPOSTE ALLA CLIENTELA)**

EVITARE DI TOCCARE CON LE MANI LA  
BOCCA E GLI OCCHI,  
PRIMA DI AVERLE LAVATE.  
EVITARE STRETTE DI MANO,  
BACI E ABBRACCI.  
NON TOCCARSI OCCHI E BOCCA  
CON LE MANI.



COPRIRSI LA BOCCA SE  
SI STARNUTISCE O  
TOSSISCE.  
USARE FAZZOLETTI  
MONOUSO PER  
SOFFIARSI IL NASO E  
GETTARLI, UNA VOLTA  
UTILIZZATI, NEI  
CESTINI



EVITARE CONTATTI RAVVICINATI CON  
PERSONE CHE PRESENTINO SINTOMI  
INFLUENZALI QUALI TOSSE E  
RAFFREDDORE.  
MANTENERE UNA DISTANZA MASSIMA  
CAUTELATIVA DI **2 METRI** DALLE  
PERSONE